

ERBICIDA



DARIUM

DISERBANTE GRAMICINICA
DI POST-EMERGENZA PER COLZA E GIRASOLE
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo d'azione: **HRAC: A**

AGROCHEM

DARIUM**DISERBANTE GRAMICINICIDA****DI POST-EMERGENZA PER COLZA E GIRASOLE****CARATTERISTICHE:**

DARIUM è un diserbante sistemico di post-emergenza ad assorbimento fogliare per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali di colza e girasole. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni e risulta ottimale in presenza di infestanti in attiva crescita.

PRINCIPI ATTIVI:

Quizalofop-p-etile puro 5,5 g. (= 50 g/L)

FORMULAZIONE:

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

SPETTRO DI ATTIVITÀ**INFESTANTI SENSIBILI:**

Frumento (*Triticum aestivum*), Triticale (*Triticum spp*), orzo comune (*Hordeum vulgare*), avena comune (*Avena sativa*), Sorghetta (*Sorghum halapense*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), falso panico (*Setaria viridis*), setaria (*Setaria sp.*), agrostide (*Apera spica-venti*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), loglierella (*Lolium rigidum*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), fienarola comune (*Poa annua*), avena selvatica (*Avena fatua*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), sorghetta (*Sorghum halapense*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), avena sterile (*avena sterilis*).

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:

Colza, Girasole: alla dose di 1.2-3,0 L/ha distribuiti con 200-400L di acqua ad ettaro, intervenendo tra la fase di 3 foglie distese e la fine allungamento fusto.

Effettuare il trattamento con le normali attrezzature utilizzate per il diserbo. Operare ad una pressione di esercizio compresa tra 1,5 e 2,5 bar e procedendo ad una velocità di 4-9 km/h.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute n. 19196 del 13/01/2026.

Usare il prodotto fitosanitario con precauzione.

Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta ministeriale e le relative informazioni sul prodotto.

Porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta.