



**ERBICIDA**

# **STRETCH**

**ERBICIDA SELETTIVO**

per il diserbo in post-emergenza del mais

**(OLIO DISPERSIBILE)**

Meccanismo d'azione: **HRAC: B**

**AGROCHEM**

# STRETCH

## ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo in post-emergenza del mais

### CARATTERISTICHE:

**STRETCH** è un erbicida fogliare di post-emergenza selettivo per il mais efficace contro le infestanti mono e dicotiledoni. Per garantire un'efficacia ottimale del prodotto, è necessario che le infestanti siano in attiva crescita (fino a 6 foglie vere) e che venga assicurata una completa copertura delle stesse.

### PRINCIPI ATTIVI:

**Nicosulfuron puro** 4 g. (= 40 g/L)

### FORMULAZIONE:

**OLIO DISPERSIBILE**

### SPETTRO DI ATTIVITÀ

**INFESTANTI SENSIBILI:** Il prodotto controlla efficacemente le seguenti infestanti:

**Graminacee:** sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), panico americano (*Panicum dichotomiflorum*), Panicastrella (*Setaria verticillata*), sorghetta (*Sorghum halepense*). **Dicotiledoni:** amaranto (*Amaranthus retroflexus*), stramonio (*Datura stramonium*), persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (*Portulaca oleracea*), ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*).

**INFESTANTI SENSIBILI:** Frumento (*Triticum aestivum*), Triticale (*Triticum spp*), orzo comune (*Hordeum vulgare*), avena comune (*Avena sativa*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), falso panico (*Setaria viridis*), setaria (*Setaria sp.*), agrostide (*Apera spica-venti*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), loglierella (*Lolium rigidum*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), fienarola comune (*Poa annua*), avena selvatica (*Avena fatua*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), sorghetta (*Sorghum halepense*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), avena sterile (*avena sterilis*).

### DOSI DI IMPIEGO:

Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo: MAIS da 2-3 fino a 5-6 foglie;

**INFESTANTI DICOTILEDONI** 2-4 foglie;

**INFESTANTI GRAMINACEE:** da 2 foglie ad inizio accostimento, sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza. Dose: 1,5 L/ha distribuiti con 400 litri d'acqua per ettaro.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute n. 16681 del 01/12/23.

Usare il prodotto fitosanitario con precauzione.

Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta ministeriale e le relative informazioni sul prodotto.

Porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta.