

CORIDA

Erbicida selettivo e sistemico per il controllo delle infestanti a foglia larga nelle colture di cereali (frumento invernale, orzo invernale e primaverile)
Granuli Idrodispersibili (WG)
Meccanismo d'azione HRAC: 2

CORIDA Registrazione Ministero della Salute n. 18405 del 25.11.2024

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron metile puro g. 75
Coformulanti q. b. a g. 100

Contenuto netto:
20-40-50-100-200-250-500g
1kg
Partita n°

Agria S.A.

Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)
 Tel +359 32273500

Stabilimenti di produzione:

Agria S.A. - Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009, Bulgaria
Jiangsu Ruidong Pesticide - no.12 Liangchang East Road, Jintan, Jiangsu, Cina

Distribuito da:

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare le polveri e gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto /recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nel caso in cui un lavoratore entri nell'area trattata, indossare pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe. Si consiglia l'uso di guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Su orzo a semina primaverile, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva del 50%.

Indossare indumenti protettivi adeguati (giacca impermeabile, pantaloni e stivali di gomma) e guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto

**ATTENZIONE****CARATTERISTICHE**

CORIDA è un erbicida sistemico ad azione fogliare per il controllo delle infestanti a foglia larga nelle colture di frumento a semina invernale e di orzo a semina invernale e primaverile. Per essere efficace CORIDA deve essere assorbito e traslocato, quindi assicurarsi una buona copertura delle infestanti intervenendo preferibilmente quando queste sono in attiva crescita (fino a 6 foglie distese).

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza di frumento a semina invernale e dell'orzo a semina invernale e primaverile.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

20 g/ha distribuiti con volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.

Effettuare il trattamento in autunno o in primavera quando le infestanti si trovano nello stadio di 2-4 foglie vere e la coltura è nella fase di allungamento fusto (BBCH 31-39). Effettuare l'applicazione su cereali a semina invernale dopo il 21 marzo. È consentito un solo trattamento l'anno.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti a foglia larga, quali ad esempio: Veronica (*Veronica persica*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Ruchetta dei muri (*Diploaxis muralis*), Centocchio (*Stellaria media*).

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire a metà la botte dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ed aggiungere la quantità di prodotto necessaria. Aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere la miscela in agitazione durante l'applicazione.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare l'applicazione di CORIDA ad erbicidi aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COLTURE IN ROTAZIONE

CORIDA non ha alcun effetto negativo sulle colture in rotazione, se seminate nell'anno solare successivo. Devono essere rispettate le seguenti restrizioni:

- In caso di fallimento della coltura, attendere 60 giorni prima della semina di avena e soia.
- Attendere 170 giorni prima della semina/trapianto di pomodoro, colza e barbabietola da zucchero.
- Attendere 220 giorni prima della semina/trapianto di colture come la cipolla.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO, ASCIUTTO E BEN VENTILATO, A RIPARO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA.

CONSERVARE A TEMPERATURE NON SUPERIORI A 35°C

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
 IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni