



COPFORCE EXTRA WG

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA

Meccanismo d'azione FRAC 27 (Cimoxanil) + M1 (Rame)

COPFORCE EXTRA WG - Registrazione del Ministero della Salute N. 18012 del 13.09.2023

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g.	6
- RAME METALLO puro	g.	30
(sottoforma di idrossido)		
- Coformulanti q.b. a	g.	100

AGRIA SA, Asenovgradsko Shose 4009
Plovdiv, Bulgaria
Tel. +359 32 273 500

Stabilimento di produzione: **AGRIA SA**
Asenovgradsko Shose 4009 Plovdiv, Bulgaria

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. **P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone **P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P308+P313** In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P330** Sciacquare la bocca. **P333+P313** in caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P363** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: J910-COMT-Y006-R6ND

Contenuto: **50-100-250-500g 1-10-25 Kg**

partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto, indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tuta, occhiali, maschera con filtro FFP2). Lavare gli indumenti protettivi e le attrezzature di distribuzione dopo l'uso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 25 metri oppure di 20 metri vegetata utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per 7 giorni dopo il trattamento. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 6% e RAME METALLO 30% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subiterno ed ematuria.

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali: ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: ---

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

COPFORCE EXTRA WG è un fungicida in granuli idrodispersibili con azione preventiva e curativa contro la Peronospora di vite, pomodoro e patata. Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia (Cimoxanil) che per contatto (Rame), combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Impiegare max 2 Kg di prodotto ad ettaro corrispondenti a 200g di prodotto per hl distribuiti con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, intervenendo tra lo stadio di grappoli separati e l'inizio dell'invaivatura (BBCH 55-80). Effettuare massimo 4 trattamenti per anno ad intervalli di 7-10 giorni.

POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)

Impiegare max 2 Kg di prodotto ad ettaro corrispondenti a 200g di prodotto per hl distribuiti con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, intervenendo tra la prima infiorescenza visibile e l'inizio della maturazione (BBCH 51-71). Effettuare massimo 4 trattamenti per anno ad intervalli di 7-10 giorni.

PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*)

Impiegare max 2 Kg di prodotto ad ettaro corrispondenti a 400-660 g di prodotto per hl distribuiti con volumi d'acqua di 300-500 L/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, intervenendo tra il primo germoglio basale visibile e l'inizio ingiallimento foglie (BBCH 21-90). Effettuare massimo 5 trattamenti per anno ad intervalli di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Non applicare il prodotto a temperature maggiori di 30°C.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Preparazione della soluzione di irrorazione: riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua, introdurre la dose prevista di prodotto, mettere in funzione l'agitatore, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo in agitazione la massa.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Per evitare o ritardare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare **COPFORCE EXTRA WG** con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA POMODORO, 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA PATATA E 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELL'UVA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**



ATTENZIONE

