

# PLANTOIL

## Olio minerale paraffinico ad azione insetticida Concentrato Emulsionabile

PLANTOIL - Registrazione Ministero della Salute n. 17210 del 12/04/2018

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
Olio di paraffina (CAS n° 8042-47-5) g. 94,0 (= 790 g/l)  
(al 98% di insulfonylabilità)  
Coformulanti q.b. a g. 100

### ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia  
Tel.: +386 2 60 90 211 — www.albaugh.eu

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h):  
+44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

DISTRIBUITO DA: **Jebagro GmbH**

Hanseatic Trade Center - Kehrwieber 11 - 20457 Amburgo (Germania)  
Tel +49 (0) 40 / 30 14 01

Stabilimenti di produzione:

**Industrias Afrasa S.A.** - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro  
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

**Albaugh TKI d.o.o.** - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

**BAC d.o.o.** - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: ---**

**REAZIONE: P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito.**

**CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 5 metri per agrumi e banana;
- 10 metri per pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 5 metri.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro AntiveleNI.

partita n

Contenuto:  
1-5-10-20-25-60 L



PERICOLO

### CARATTERISTICHE

PLANTOIL è un prodotto ad alta concentrazione di olio paraffinico. PLANTOIL ha un alto potere insetticida per il controllo di tutti i tipi di cocciniglie e acari. PLANTOIL è anche efficace contro la fumaggine causata da attacchi di cocciniglie. PLANTOIL è indicato per il controllo delle cocciniglie e degli acari.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**AGRUMI (arancio, limone, mandarino, limetta, pompelmo), contro acari (*Panonychus citri*, *Eutetranychus banksi*, *Tetranychus urticae* e *Eutetranychus orientalis*) e cocciniglie (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Lepidosaphes spp*, *Parlatoria pergandii*).** Intervenire alla dose di 1-1,5 L/hL, distribuiti con 1000-2000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 10-30 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

**POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone) contro cocciniglia (*Quadraspidiotus perniciosus*).** Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

**DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio) contro cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudaulacaspis pentagona*).** Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L. Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

**OLIVO contro cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*).**

Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L, intervenendo prima della fioritura o tra l'allegagione e l'inizio indurimento del nocciolo (BBCH 71-75). Effettuare un solo trattamento per anno.

**VITE contro cocciniglie (*Parthenolecanium corni*, *Planococcus citri*, *Planococcus ficus* e *Pseudococcus Comstocki*), trattamenti invernali in pre-fioritura; contro acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*),** intervenire alla comparsa degli adulti. Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

**BANANO contro acari (*Tetranychus urticae*),** intervenire in primavera alla comparsa degli adulti; **contro cocciniglie (*Dysmicoccus grassii*),** intervenire alla comparsa dei grappoli floreali; Applicare alla dose di 1,2-2 L/hL, distribuiti con 1500-2500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 30 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

Utilizzare volumi d'acqua adeguati ad assicurare una completa bagnatura della vegetazione trattata.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** Agitare bene prima dell'uso. È consigliabile l'utilizzo di un agente anti-schiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

Non applicare il prodotto prima che siano trascorsi almeno 40 giorni dal trattamento con zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta..

**FITOTOSSICITÀ:** Non effettuare trattamenti in giornate calde e secche.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# SAROIL

## Olio minerale paraffinico ad azione insetticida Concentrato Emulsionabile

### SAROIL

Registrazione Ministero della Salute n. 18723 del 22/07/2024

#### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
Olio di paraffina (CAS n° 8042-47-5) g. 94,0 (= 790 g/l)  
(al 98% di insulfonylabilità)  
Coformulanti q.b. a g. 100

### Exclusivas Sarabia S.A.U.

Poligono Ind. Fondo de Litera, A2, Km 441,6  
22520 Fraga (Huesca) Spagna  
Tel. +34 973 737377



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: ---**

**REAZIONE: P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito.**

**CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

#### Officina di produzione:

EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.U. Lleida (Spagna)

#### Distribuito da:

HELM ITALIA S.r.l.; Via Gustavo Fara, 26 - 20124 Milano Tel 02 8295 5520  
Rainbow Agrosociences Italy S.R.L., Cassano d'Adda (MI), Via Milano n. 12.  
Tel. +34 973737377

#### Contenuto:

1<sup>l</sup>-5<sup>l</sup>-10<sup>l</sup>-20<sup>l</sup>-25<sup>l</sup>-60<sup>l</sup>-1000<sup>l</sup> L

Partita n. vedi confezione

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 5 metri per agrumi e banano;
- 10 metri per pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 5 metri.

#### INFORMAZIONI MEDICHE

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

#### CARATTERISTICHE

SAROIL è un prodotto ad alta concentrazione di olio paraffinico. SAROIL ha un alto potere insetticida per il controllo di tutti i tipi di cocciniglie e acari. SAROIL è anche efficace contro la fumaggine causata da attacchi di cocciniglie. SAROIL è indicato per il controllo delle cocciniglie e degli acari.

#### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare il trattamento (1 per anno) prima dell'invasatura.

**AGRUMI (arancio, limone, mandarino, limetta, pompelmo), contro acari (*Panonychus citri*, *Eutetranychus banksi*, *Tetranychus urticae*) e cocciniglie (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Lepidosaphes spp*, *Parlatoria pergandii*).** Intervenire alla dose di 1-1,5 L/hL, distribuiti con 1000-2000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 10-30 L

**POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone) contro cocciniglia (*Quadraspidiotus perniciosus*).** Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L.

**DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio) contro cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudaulacaspis pentagona*).** Intervenire alla dose di 0,75-1 L/hL, distribuiti con 500-1500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 3,75-15 L.

**OLIVO contro cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*).**

Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L, intervenendo prima della fioritura o tra l'allegagione e l'inizio indurimento del nocciolo (BBCH 71-75). Effettuare un solo trattamento per anno.

**VITE contro cocciniglie (*Parthenolecanium corni*, *Planococcus citri*),** trattamenti invernali in pre-fioritura; **contro acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*),** intervenire alla comparsa degli adulti. Applicare alla dose di 1,5-3 L/hL, distribuiti con 500-1000 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 15 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

**BANANO** contro acari (*Tetranychus urticae*), intervenire in primavera alla comparsa degli adulti; contro cocciniglie (*Dysmicoccus grassii*), intervenire alla comparsa dei grappoli floreali; Applicare alla dose di 1,2-2 L/hL, distribuiti con 1500-2500 L/ha di acqua, corrispondenti ad una dose di prodotto per ettaro di 30 L. Effettuare un solo trattamento per anno.

Utilizzare volumi d'acqua adeguati ad assicurare una completa bagnatura della vegetazione trattata.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** Agitare bene prima dell'uso. È consigliabile l'utilizzo di un agente antischiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

#### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

Non applicare il prodotto prima che siano trascorsi almeno 40 giorni dal trattamento con zolfo, polisolfuri, captano o folpet.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Non effettuare trattamenti in giornate calde e secche.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**

<sup>1</sup>Il contenitore non può essere riutilizzato

<sup>2</sup>**ATTENZIONE:** Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. L'utilizzo della taglia da 1000L è consentito esclusivamente impiegando un sistema di trasferimento chiuso, omologato e adatto alla sostanza da trasferire