

RIVAL® DUO

FUNGICIDA PREVENTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DELLA PATATA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
Meccanismo d'azione: FRAC 28 + 27

RIVAL® DUO - Registrazione Ministero della Salute n.18574 del 25.09.2024

Composizione - 100 g di prodotto contengono:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Propamocarb cloridrato puro | g. 36,46 (= 400 g/l) |
| Cimoxanil puro | g. 4,56 (= 50 g/l) |
| Coformulanti q.b. a | g. 100 |

Contenuto: 0,25-0,5-1-5-10 L

Partita n.

Agria S.A.

Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)

Tel +359 32273500

Stabilimento di produzione: Agria S.A.
Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)

Distribuito da:

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280: Indossare guanti, protezione per gli occhi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Propamocarb cloridrato e Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **PROPAMOCARB CLORIDRATO 36,46%** e **CIMOXANIL 4,56%**, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

PROPAMOCARB CLORIDRATO: è un carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi.

Consigli terapeutici: Nel caso di intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato; praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina soltanto per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi.

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

RIVAL® DUO è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil (fungicida citotropico). Entrambi le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora della patata (*Phytophthora infestans*) con meccanismi d'azione diversi e complementari.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Il prodotto si impiega su patata in trattamenti fogliari. Le dosi di seguito indicate si riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, assicurarsi che venga mantenuta l'uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.

PATATA: Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*): applicare alla dose di 2,5 l/ha distribuiti con 200-500 litri d'acqua, iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi, dopo la fine dello sviluppo fogliare e fino alla senescenza (BBCH 20-95). Effettuare al massimo 4 trattamenti ad intervalli di 7 giorni tra un'applicazione e la successiva.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO