

STRETCH

**Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais
(OLIO DISPERSIBILE)
Meccanismo d'azione HRAC: B**

STRETCH - Registrazione del Ministero della Salute n. 16681 del 01/12/23

Composizione:

Nicosulfuron puro	g.	4 (= 40 g/L)
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd

Administration Building of Agria SA, Asenovgradsko
Shose, Plovdiv 4009, Bulgaria Tel. +359 2 9150500

Stabilimenti di produzione:

Agria SA - Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009,
Bulgaria

Anhui Jiuyi Agriculture Co. Ltd

Hefei Circulate Economy Zone, Anhui, China



ATTENZIONE

Distribuito da: Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

È raccomandato l'uso dei guanti sia per l'operatore durante le fasi di carica, miscela ed applicazione del prodotto, sia per il lavoratore per eventuali lavori agricoli. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia vegetata non trattata di 5 metri da zona non coltivata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

STRETCH è un erbicida fogliare di post-emergenza selettivo per il mais efficace contro le infestanti mono e dicotiledoni. Per garantire un'efficacia ottimale del prodotto, è necessario che le infestanti siano in attiva crescita (fino a 6 foglie vere) e che venga assicurata una completa copertura delle stesse.

INFESTANTI SENSIBILI

Il prodotto controlla efficacemente le seguenti infestanti:

Graminacee: sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), panico americano (*Panicum dichotomiflorum*), Panicastrella (*Setaria verticillata*), sorghetta (*Sorghum halepense*).

Dicotiledoni: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), stramonio (*Datura stramonium*), persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (*Portulaca oleracea*), ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*).

DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

MAIS da 2-3 fino a 5-6 foglie;

INFESTANTI DICOTILEDONI 2-4 foglie;

INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento, sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Dose: 1,5 L/ha distribuiti con 400 litri d'acqua per ettaro.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'impiego ripetuto nella stessa area di prodotti appartenenti alla stessa famiglia chimica o che presentano lo stesso meccanismo d'azione può far emergere fenomeni di resistenza. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COLTURE IN ROTAZIONE

STRETCH non ha alcun effetto negativo sulle colture successive se applicato nell'ambito di una corretta pratica rotazionale, i cereali possono essere seminati dopo 3 mesi dall'applicazione di STRETCH. In caso di fallimento del raccolto si raccomanda di aspettare la primavera successiva prima di seminare qualsiasi coltura, ad eccezione dei cereali che possono essere seminati già dopo 3 mesi dall'applicazione di STRETCH.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua, introdurre la dose prevista di prodotto, mettere in funzione

l'agitatore quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato, mantenendo in funzione l'agitatore fino al completamento del trattamento.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE

Non conservare il prodotto a temperature superiori a 40 °C

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**